

• 研究方法(Research Method) •

随机截距潜在转变分析(RI-LTA) ——个案自我转变与个案间差异的分离

温聪聪¹ 朱红²

(¹厦门大学国际学院, 厦门 361102)(²北京大学教育经济研究所, 北京 100871)

摘要 传统的潜在转变分析属于单水平分析,但其同样也可以看作二水平分析。Muthén 和 Asparouhov 就以二水平分析的视角在单水平分析框架内提出了随机截距潜在转变分析(RI-LTA),其中跨时间点产生的自我转变可以看作在水平1进行分析,跨时间点不变的个案间差异可以看作在水平2进行分析,使个案的自我转变和个案间的初始差异分离,避免了高估保留在初始类别的概率。某研究型大学2016级本科生的追踪调查数据被用于演示使用随机截距潜在转变分析的过程。该方法的重大优势是通过引入随机截距避免了高估保留在本类别的转变概率。未来研究可以运用蒙特卡洛模拟研究探究随机截距潜在转变分析模型的适用性,也可以用多水平分析的思路为灵感,探究多水平随机截距潜在转变分析在统计软件中的实现。

关键词 潜在转变分析,随机截距潜在转变分析,单水平分析,多水平分析,蒙特卡洛模拟研究

分类号 B841

1 研究背景

传统的分组研究方法大多数聚焦于变量,如性别、专业、年龄等。近年来,聚焦于个案的混合模型越来越受到研究者的青睐(Collins & Lanza, 2009)。聚焦于变量的研究方法是为了通过已知分组变量确定可观测子样本之间的差异,聚焦于个案的潜在类别分析则是为了确定不可观测子样本之间的差异(Wang & Wang, 2019)。

潜变量混合模型的鼻祖是潜在类别分析(latent class analysis, LCA),于1950年由Lazarsfeld提出,并由Lazarsfeld、Henry、Goodman等人进一步发展推广,该方法通常应用于横截面数据分析。而当所研究数据样本为纵贯数据,存在多个时间点时,那么就需要使用潜在类别分析的衍生模型——潜在转变分析(latent transition analysis, LTA)。自上世纪90年代开始,潜在转变分析方法逐渐进入国外研究者的视野(Collins & Wugalter, 1992),被应

用于许多社会科学与行为科学研究(Jagenow et al., 2015; Pan et al., 2017; Ryoo et al., 2018),医学与公共卫生研究(Cochran et al., 2015; Cosden et al., 2015; Kenzik et al., 2015),和教育研究中(Liu et al., 2016; Ryoo et al., 2015)。

我国研究者使用潜在转变分析始于2011年,吴鹏和刘华山(2011)首次引入潜在转变分析,使用该方法探究初中生攻击行为。随后,潜在转变分析被应用于研究中学生的自我伤害行为(胡俊,张敏强,2013;王碧瑶等,2014,2015),初中同伴侵害(杨晓霞等,2020),青少年网络成瘾的发展趋势(谢晋艳等,2018),大学生的自杀风险(刘爱楼,欧贤才,2018),美国老年人的孤独感及其影响因素(吴国婷等,2017;吴国婷等,2018),以及我国成年人抑郁症状况和发展趋势(廖友国,连榕,2020)。潜在转变分析已经成为国内外心理学、社会学研究领域一种较为常用的研究方法。但该方法在应该遵循的流程,应当报告的估计结果和统计量结果,最终解的有效性方面存在争议,缺乏一致的使用标准,导致该方法在使用过程中易受研究者的主观影响。

收稿日期: 2020-10-12

通信作者: 朱红, E-mail: hongzhu@pku.edu.cn

潜在转变分析模型可以用下式来表示(Nylund, 2007; Wang & Wang, 2019)。其中, $\tau_{ct|c(t-1)}$ 表示个案在归属时间点 $t-1$ 时的类别 $c_{(t-1)} = k$ 的前提下, 在时间点 t 转变到类别 $c_t = m$ 的概率。C 为 c_t 和 $c_{(t-1)}$ 的类别数, 二者一般相等。为了使 c_t 在 $c_{(t-1)}$ 上做回归, c_t 的最后一个类别被默认设为参照组。由于 $c_{(t-1)}$ 在模型中也是一个多分类自变量, 需要使用多分类 logistic 回归, 所以需要创造 $C-1$ 个虚拟变量 $d_1, d_2, \dots, d_{C-1}$ 作为 logits 的指标, 此时 d_C 也为 0, 被设为参照组。 α_m 为转变到时间点 t 的类别 m 时的截距, $\beta_{mk}d_k$ 为个案在时间点 t 相对于参照组 $c_t = C$, 属于类别 m 的概率与在时间点 $t-1$ 相对于参照组 $c_{(t-1)} = C$, 属于类别 k 的概率的比数比再取对数。对于每个时间点 $t = 1, 2, \dots, t$, 分别有 $C-1$ 个 α 和 $C-1$ 个 β 参数需要估计。如果模型中还需要引入分类协变量(covariate), 那么就需要再加入 $\gamma_m x$ 项和 $\gamma_{ct} x$, 协变量的最后一个类别也是被设为参照组。

$$\tau_{ct|c(t-1)} = P(c_t = m | c_{(t-1)} = k) = \frac{\exp(\alpha_m + \beta_{mk}d_k + \gamma_m x)}{1 + \sum_{c_t=1}^{C-1} \exp(\alpha_{c_t} + \beta_{c_tk}d_k + \gamma_{c_t} x)} \quad (1)$$

潜在转变分析可以被看作是单水平(single-level)分析, 探究样本在不同时间点上的分类别情况和各类别的转变情况。模型暗含一个假设, 即观测指标变量跨时间点的相关性被潜在类别变量间的相关性完全解释。同时, 潜在转变分析也可以被看作是二水平(two-level)分析, 其中跨时间点产生的自我转变在水平 1 进行分析, 跨时间点不变的个案间差异在水平 2 进行分析(Muthén & Asparouhov, 2020)。二水平分析可以得到更为准确的转变概率, 因为它把个案的自我转变和个案间的初始差异进行分离, 使潜在类别变量间的相关性只解释跨时间点产生的自我转变。这一想法曾在多篇文献中被提出, 例如有关潜在特质因子-潜在类别建模(latent trait-state modeling)的文章(Kenny & Zautra, 1995; Cole et al., 2005; Eid et al., 2017)把不变的个案间差异看作由一个连续潜变量表示的潜在特质因子; Hamaker 等人以交叉滞后面板建模(cross-lagged panel modeling)为例, 提倡把不变的个案间差异(随机截距)分离, 使所有前测时间点只影响各自相邻下一个后测时间点, 交叉滞后关系不

受个案间差异的影响(Hamaker et al., 2015)。Kenny 和 Zautra (1995)最早提出了要将潜在特质因子和潜在类别分离。在他们提出的模型中, 观测指标是潜在特质因子、潜在类别和代表着测量误差的残差的加和, 最重要的特点是潜在特质因子直接影响观测指标, 不直接影响潜在类别。如此设定后, 潜在类别不受潜在特质因子影响, 意味着潜在类别间的关系不受跨时间点不变的个案间差异的影响。Kenny 和 Zautra 以及 Hamaker 等人研究的共同点是观测指标是连续变量。而当观测指标和潜在变量都是分类变量时, Eid 和 Langeheine (1999, 2003)研究了潜在特质因子-潜在类别建模, 由属于不同时间点的潜在类别变量和潜在类别变量特质因子共同影响分类观测指标。这一模型本质是随机截距潜在转变分析, 但在当时并没有使用这一名称。总之, 由于普通潜在转变分析没有分离出跨时间点不变的个案间差异, 可能导致得出有偏误的模型参数估计结果, 尤其是较大偏误的潜在类别转变概率结果。直到 2020 年, Muthén 和 Asparouhov 正式提出了随机截距潜在转变分析模型, 在单水平分析中利用二水平分析的思想实现了个案自我转变与个案间差异的分离。这一模型的提出标志着潜在转变分析进入了一个新的发展阶段。

本文拟首先简要介绍随机截距潜在转变分析模型。其次, 运用某研究型大学 2016 级本科生追踪调查数据演示使用随机截距潜在转变分析的过程, 进而探究普通潜在转变分析究竟如何高估了保留在本类别的转变概率, 让读者了解随机截距潜在转变分析的优势。同时运用蒙特卡洛模拟原模型的方式验证本研究中随机截距潜在转变分析模型估计参数的效果, 演示如何检验随机截距潜在转变分析在特定情境中的有效性。最后, 通过引入入学方式协变量, 演示如何在随机截距潜在转变分析模型框架中进行多群组分析和交互效应分析, 为随机截距潜在转变分析模型的应用和拓展提供参考。总之, 鉴于国内目前尚未有研究运用随机截距潜在转变分析模型来拟合数据样本, 或运用蒙特卡洛模拟实证数据的方法进行检验, 本研究希望让更多的研究者了解这一方法。

2 研究模型介绍

本部分将对随机截距潜在转变分析模型进行

简要介绍,希望能让国内研究者对这一新方法有所了解 and 认识。图 1 展示了时间点数量为 2 时的随机截距潜在转变分析模型路径图。其中 f 代表随机截距, $y_{11}, y_{12}, \dots, y_{1p}$ 代表时间点 t_1 上的 p 个观测指标, $y_{21}, y_{22}, \dots, y_{2p}$ 代表时间点 t_2 上的 p 个观测指标, c_1 代表时间点 t_1 的潜在类别变量, c_2 代表时间点 t_2 的潜在类别变量。




图 1 时间点数量为 2 时的随机截距潜在转变分析模型路径图

随机截距 f 既可以是数个连续的潜在因子,也可以是一个多分类潜变量,但根据 Muthén 和 Asparouhov 文章中情绪案例和约会案例的研究结果,随机截距 f 为连续潜在因子的模型拟合指标会优于随机截距 f 为多分类潜变量的模型拟合指标,使用连续的潜在因子作为随机截距是更好的选择(Muthén & Asparouhov, 2020)。为了简化模型分析,减少不必要的运算时间,随机截距潜在因子的数量被设定为 1。另外,模型中一些隐含的假设也需要进行说明,例如模型假设个案间初始差异不随时间改变,时间点 t_1 的 p 个观测指标的因子载荷 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ 被设定和时间点 t_2 的 p 个因子载荷两两对应完全相等;为了简化分析,对于不同的潜在类别,对应的因子载荷也被设为完全相等的同指标;随机截距 f 直接影响各时间点上的各观测指标,不会直接影响潜在类别变量 c_1, c_2 ,但却会解释一部分跨时间点的相关性,也就是个案间差异,从而影响转变概率;在随机截距潜在转变分析中,如果存在 n 个时间点,那么 c_n 有可能影响 c_{n-1} ,也有可能影响 c_{n-2}, c_{n-3} ,但为了简化分析,模型仅假设 c_n 影响 c_{n-1} ;潜在转变分析的指标可以是连续变量或是虚拟变量,多分类变量,定序多分类变量,计数变量等,但当观测指标的

数量与每个观测指标的填答类型较多时,总的填答类型情况过多会导致有的填答情况没有或只有极少数人填答,从而影响潜在转变分析模型的识别,所以应当尽量使用填答类型较少的虚拟变量作为观测指标。

随机截距潜在转变分析中的随机截距 f 是关键。如果观测指标在随机截距上的因子载荷较大,说明观测指标概率较大,个案在该观测指标上的初始差异较大。从这一角度来看,随机截距可以看作是吸收了模型中的测量不等性(measurement noninvariance)。正因为观测指标上的差异较大,各类别之间的区分度较高,这部分差异会被随机截距吸收并且不影响潜在类别变量,所以潜在类别间转变概率矩阵的非对角线转变概率会较高。而在普通的潜在转变分析中,各类别之间的高区分度没有被随机截距吸收,会直接影响潜在类别的转变概率,所以各类别间转变概率矩阵的非对角线转变概率会较低,对角线转变概率(保留在初始类别概率)较高。根据 Muthén 和 Asparouhov 文章中的实例和蒙特卡洛模拟研究,随机截距潜在转变分析模型的模型拟合指标总是优于普通潜在转变分析,所以可以认为普通潜在转变分析高估了不同类别保留在初始类别的概率(Muthén & Asparouhov, 2020)。

随机截距潜在转变分析模型的公式如下:

$$\text{logit}[P(U_{pit} = 1) | C_{it} = j, f_i] = \alpha_{pj} + \lambda_{pj} f_i \quad (2)$$

其中 U_{pit} 为属于个案 i , 时间点 t 的第 p 个虚拟变量观测指标, $C_{it} = j$ 表示属于个案 i , 时间点 t 的第 j 个潜在类别, α_{pj} 代表在潜在类别变量观测指标上的模型参数, λ_{pj} 表示第 p 个观测指标的因子载荷, f_i 表示属于个案 i 的因子得分,因子的分布为 $N(0, 1)$ 。在普通潜在转变分析中,模型要分析观测指标以类别 j 为前提条件的条件概率 $P(U_{pit} = 1 | C_{it} = j)$,而在随机截距潜在转变分析模型中,观测指标的条件概率不仅要以类别 j 为前提条件,还要以 f_i 为前提条件。在观测指标为虚拟变量时, f_i 的正因子得分越高,代表回答 $U_{pit} = 1$ 的概率越高; f_i 的负因子得分越高,代表回答 $U_{pit} = 0$ 的概率越高。所以,绝对值大的正负因子得分意味着不同类别间差异较大,不会轻易转变类别。这也说明如果数据是基于随机截距潜在转变分析生成的,普通潜在转变分析会倾向于高估保留在初始类别的概率。

3 研究步骤

随机截距潜在转变分析目前仅可以在 Mplus 软件中执行, 需要使用最新的 Mplus 8.5 版本, 模型估计方法默认采用最大似然估计法(maximum likelihood), 可以分析纵贯跨时序数据或是进行蒙特卡洛模拟研究。在 Mplus 软件中进行随机截距潜在转变分析的步骤可以归纳为以下 4 步:

(1) 针对不同的时间点分别进行潜在类别分析(LCA), 探究每个时间点上的样本包含的类别数。

(2) 进行普通潜在转变分析和随机截距潜在转变分析, 探究逐渐引入不同时间点潜在类别变量、随机截距后样本包含的类别数以及转变概率。将所得的模型拟合指数结果作比较, 得出最优模型。

(3) 利用该最优模型的参数估计结果进行蒙特卡洛模拟研究, 验证特定情境下待分析模型估计各项参数的有效性。

(4) 根据已有的理论假设或是实际研究需要, 引入背景协变量(covariate)和远端结果变量(distal outcome)进行分析, 或是做多群组分析(multiple-group analysis)、马尔科夫链变动-保留分析(mover-stayer analysis)、多水平随机截距潜在转变分析、跨时序因子分析(longitudinal factor analysis), 对数据样本进行更深层次的探究。

研究者在进行数据分析时不一定要完全参照以上 4 个步骤。如果需要进行随机截距潜在转变分析, 步骤一和步骤二必须要进行, 步骤三和步骤四可以选择是否进行。下文将以某研究型大学本科生的学习动机数据为例, 进行随机截距潜在转变分析的演示。

4 研究实例

本研究使用某研究型大学 2016 级本科生的追踪调查数据, 分析就读期间样本学生内部和外部学习动机发展的趋势。两次调查时间分别在 2016 年(入学前暑假至入学后一个月)和 2018 年(大三上学期)。其中填答无缺失值的个案有 634 人, 本研究将使用这 634 人的填答作为总样本。问卷中的学习动机量表设置内部动机和外部动机两个维度, 内部动机包括挑战性和热衷性的题项, 外部动机包括依赖他人评价、关注人际竞争和追求回报等方面的题项。题项使用从“很不符合”到“很符合”的 4 点计分。学习动机量表的内容构成

如表 1 所示。

表 1 学习动机量表维度与具体内容

维度	题号	题项内容
外部 动机	Q1	对我而言成功意味着比别人做得更好
	Q2	成绩是推动我去努力的主要动力
	Q3	我希望别人发现我在学业上很出色
	Q4	他人的肯定和赞赏是推动我去努力的主要动力
	Q5	我很在乎别人对我的观点怎么反应
	Q6	我认为表现很好但无人知晓是没有意义的
内部 动机	Q7	我乐于尝试解决复杂的问题
	Q8	我喜欢独立思考解决疑难
	Q9	我乐于钻研那些全新的问题
	Q10	我希望大学学习能够提供我增加知识与技能的机会

用于估计模型参数的列联表源于 4 个选项, 10 个观测指标, 2 个时间点的原始数据, 这样就产生了 1099511627776 种不同情况。由于大量的不同情况以及个别题项中的选项出现无人选择的情况(empty cell), 导致潜在转变分析模型难以识别。另外, 随机截距潜在转变分析限制测量不变性, c_1 和 c_2 中各潜在类别的得分限制相等, 随机截距 f 上的因子载荷也不随时间点改变, 如果类别数不统一, 会使模型无法运行, 结果也会产生偏移。为了解决这些问题, 本研究将 4 点计分观测指标转换为虚拟变量, “很不符合”和“比较不符合”赋分为 0, “比较符合”和“很符合”赋分为 1。将观测指标转换为二分虚拟变量后, 列联表的不同情况降为 1048576 种, 有效避免了模型识别问题。量表信效度良好, 克隆巴赫系数为 0.70, 符合统计分析的标准。

4.1 潜在类别分析(LCA)

首先, 使用 Mplus 8.5 版本软件分别在 2016 年和 2018 年两个时间点运行潜在类别分析¹, 得到表 2 所示的输出结果。对于类别数目不同的潜在类别分析模型, 对数似然值越高, 模型拟合越好; 贝叶斯指数 BIC (信息指数)越小模型拟合越好。为了使各类别具有分析意义, 占总样本比率

¹ 本研究实例所涉及的所有 Mplus 语法文件已经上传至 OSF 官方网站, 项目链接为: <https://osf.io/8529q/>

低于 3% 的潜在类别被认为不具有代表性(Ryoo et al., 2018)。在本研究中, 在 2016 年时间点, 随着类别数目逐渐升高, 对数似然值越来越高, 贝叶斯指数 BIC 在类别数目为 3 时达到最小值, 数目为 4 时出现升高, 所以类别数为 3 的解为最优解。在 2018 年时间点, 随着类别数目逐渐升高, 对数似然值越来越高, 贝叶斯指数 BIC 在类别数目为 4 时达到最小值, 数目为 5 时出现升高, 所以类别数为 4 的解为最优解。

表 2 在两个时间点依次增加类别数目的潜在类别分析结果($N = 634$)

时间点	类别数	对数似然值	BIC	最小类别占总样本比率
2016, c_1	2	-2795.37	5726.23	47.0%
2016, c_1	3	-2709.70	5625.87	10.8%
2016, c_1	4	-2686.64	5650.71	10.5%
2018, c_2	2	-3268.72	6672.94	43.4%
2018, c_2	3	-3157.45	6521.36	24.3%
2018, c_2	4	-3101.55	6480.54	7.6%
2018, c_2	5	-3080.31	6509.03	6.3%

4.2 普通潜在转变分析(LTA)和随机截距潜在转变分析(RI-LTA)


其次, 将分别属于 2016 年时间点和 2018 年时间点的潜在类别变量 c_1 、 c_2 同时引入潜在转变分析模型和随机截距潜在转变分析模型进行分析, 得到输出结果(表 3 所示)。相比普通潜在转变分析, 随机截距潜在转变分析的不同是需要额外引入随机截距 f 以便影响所有时间点上的观测变量。此时, 同一观测变量在不同时间点上的因子载荷被设置为相等。从整体来看, 当分析同样的类别数

时, 随机截距潜在转变分析比普通潜在转变分析多估计模型拥有的观测指标数目的因子载荷参数(在本例中为 10 个), 对数似然值相对更大, 贝叶斯指数 BIC 相对更小。这说明随机截距潜在转变分析模型拟合数据样本的效果普遍优于普通潜在转变分析, 有必要引入随机截距。从对数似然值来看, $c_1 = 3$, $c_2 = 4$ 时的随机截距潜在转变分析模型取得最大值。从贝叶斯指数 BIC 来看, $c_1 = 3$, $c_2 = 3$ 时的随机截距潜在转变分析模型取得最小值。根据 Muthén 和 Asparouhov 文章中的做法(2020), 当对数似然值和贝叶斯指数 BIC 出现不同结果时, 需要以贝叶斯指数 BIC 为准(Muthén & Asparouhov, 2020)。此外, 从模型估计的参数数目来看, $c_1 = 3$, $c_2 = 3$ 时的随机截距潜在转变分析模型仅估计 48 个参数, $c_1 = 3$, $c_2 = 4$ 时的随机截距潜在转变分析模型要估计 91 个参数, 相比之下前者更为简洁。综上所述, 应当选取 $c_1 = 3$, $c_2 = 3$ 的随机截距潜在转变分析结果为最优解。

然后, 需要根据 Mplus 输出结果对潜在类别进行分类与命名。图 2 展示了 3 个潜在类别在各个题项上的填答概率。从图中可以看出, 3 个类别在题项 10 上认为重要的概率都很高, 可以区分这 3 个类别学习动机情况的题项为题项 1 至题项 9。由于学习动机量表的第 1~6 题为外部动机(依赖他人评价、关注人际竞争和追求回报), 第 7~10 题为内部动机(挑战性和热衷性), 可以对 3 个类别进行分类命名。类别 1 在题项 1 至题项 9 的填答概率都相对较低, 可以命名为消极组; 类别 2 在题项 1 至题项 9 的填答概率都很高, 可以命名为积极组; 类别 3 在题项 1 至题项 6 的填答概率较低, 在题项 7 至题项 9 的填答概率较高, 可以命名为重视内部动机组。

表 3 不同潜在转变分析模型的分析结果($N = 634$)

所分析模型	类别数	估计参数数目	对数似然值	BIC
普通潜在转变分析	$c_1 = 3, c_2 = 3$	38	-5857.19	11959.56
普通潜在转变分析	$c_1 = 3, c_2 = 4$	81	-5747.69	12017.99
普通潜在转变分析	$c_1 = 4, c_2 = 4$	55	-5780.99	11916.84
普通潜在转变分析	$c_1 = 5, c_2 = 5$	74	-5718.64	11914.72
随机截距潜在转变分析	$c_1 = 3, c_2 = 3$	48	-5725.25	11760.20
随机截距潜在转变分析	$c_1 = 3, c_2 = 4$	91	-5664.63	11916.40
随机截距潜在转变分析	$c_1 = 4, c_2 = 4$	65	-5691.77	11802.92
随机截距潜在转变分析	$c_1 = 5, c_2 = 5$	84	-5657.61	11857.19

图2 随机截距潜在转变分析所得3个类别在各题项上的填答概率($N = 634$)

进一步分析输出结果,可以得到3个类别在两个时间点上的转变概率,如表4所示。在类别1和类别3,保留在本类别的概率变化不大;但在类别2,普通潜在转变分析保留在本类别的概率高达68.9%,而随机截距潜在转变分析保留在本类别的概率降至33%,这说明随机截距 f 吸收了个案间的初始差异,普通潜在转变分析高估了类别2保留在本类别的概率,使用随机截距潜在转变分析是更合理的。

表4 3个类别在两个时间点的转变情况($N = 634$)

类别转变情况	普通潜在转变分析		随机截距潜在转变分析	
	个案数	转变概率	个案数	转变概率
$c_1\#1 \rightarrow c_2\#1$	49	74.1%	58	73.9%
$c_1\#1 \rightarrow c_2\#2$	16	24.8%	11	14.7%
$c_1\#1 \rightarrow c_2\#3$	1	1.1%	9	11.4%
总计	66	100%	78	100%
$c_1\#2 \rightarrow c_2\#1$	62	24.4%	37	55.5%
$c_1\#2 \rightarrow c_2\#2$	173	68.9%	22	33.0%
$c_1\#2 \rightarrow c_2\#3$	17	6.7%	8	11.5%
总计	252	100%	67	100%
$c_1\#3 \rightarrow c_2\#1$	64	20.4%	109	22.4%
$c_1\#3 \rightarrow c_2\#2$	101	31.8%	121	24.7%
$c_1\#3 \rightarrow c_2\#3$	151	47.8%	259	52.9%
总计	316	100%	489	100%

4.3 蒙特卡洛模拟研究

在此部分,利用随机截距潜在转变分析保存下来的参数估计结果生成新的数据组,设定原模

型为待分析模型,进行蒙特卡洛模拟研究,验证该情境下随机截距潜在转变分析模型估计各参数的有效性。模型设定仍然是20个虚拟变量观测指标, c_1 和 c_2 类别数均为3,总样本量仍为634,生成数据组数量为500组,模型分析类型为混合模型。由于加入了随机截距,需要额外进行一次定积分计算,所以在Mplus分析指令中也需要进行相应设定。

500组数据分析的部分参数估计结果如表5所示。选取的参数包括随机截距上的第一个和第十个因子载荷 λ_1 和 λ_{10} ,时间点 t_1 时潜在类别变量 c_1 中第一个类别的第二个截距 $c_1\#1 v_2$,时间点 t_1 时潜在类别变量 c_1 中第二个类别的第十个截距 $c_1\#2 v_{10}$,时间点 t_1 时潜在类别变量 c_1 中第三个类别的第四个截距 $c_1\#3 v_4$,潜在类别变量 c_1 中相对于参照类别(默认为最后一个类别)属于第二个类别的比数对数 $c_1\#2$,潜在类别变量 c_2 中相对于参照类别属于第二个类别的比数对数 $c_2\#2$ 。从估计值和偏差来看,随机截距潜在转变分析能较为准确地估计该情境条件下的数据组,只有 λ_{10} 的偏差达到0.05,且该偏差占真值的比率不超过5%,属于可以接受的范围。从均方误差来看,各参数的均方误差较小,只有 λ_{10} 的均方误差稍大,达到了0.2。从标准差和平均标准误的比值来看,比值在0.95~1.05的范围内波动,属于可接受范围(Asparouhov & Muthén, 2014)。从95%置信区间真值覆盖率来看,绝大多数参数的覆盖率较好,只有 $c_1\#2 v_{10}$ 的真值覆盖率为0。

根据以上的结果可以看出,大部分参数都满

表 5 基于实际研究数据的蒙特卡洛模拟研究的部分参数估计结果(N = 634)

统计量	λ_1	λ_{10}	$c_{1\#1} v_2$	$c_{1\#2} v_{10}$	$c_{1\#3} v_4$	$c_{1\#2}$	$c_{2\#2}$
真值	1.27	1.41	-0.04	-996.34	0.63	-2.00	-0.76
估计值	1.27	1.46	-0.03	-996.34	0.64	-2.04	-0.75
偏差	0	0.05	0.01	0	0.01	0.04	0.01
均方误差	0.02	0.20	0.04	0	0.02	0.09	0.03
标准差/平均标准误	0.96	1.05	0.96	-	0.97	0.89	0.98
95%置信区间真值覆盖率	93.8%	94.8%	95.2%	0	95.6%	96.8%	94.0%

足偏差、均方误差、标准差/平均标准误、95%置信区间真值覆盖率的可接受标准, 参数估计效果较好。不过 λ_{10} 和 $c_{1\#2} v_{10}$ 的估计效果较为不理想, 说明观测指标 y_{10} 和 y_{20} 出现了问题。进一步检查输出结果发现, 3 个类别在题项 10 上的填答概率都很高, 尤其是类别 2 和类别 3 达到了 1, 也就是说这两个类别中 100% 的学生在题项 10 回答“符合”。缺乏 0 的填答会产生天花板效应, 最终导致相关参数的异常估计, 这也就是出现了 $c_{1\#2} v_{10}$ -996.34 的异常截距值和 λ_{10} 出现较大偏差的原因。再检查 $c_{1\#3} v_{10}$ 的估计结果, 也是达到了 -286.78 的异常值。不过, 这样的天花板效应只会影响相关观测指标参数的估计值, 并不会对个案分组和转变概率造成影响。

4.4 引入协变量进行多群组分析和交互效应分析

完成蒙特卡洛模拟分析后, 一些研究者可能并不满足于得出分类结果和转变概率, 还希望引入其他的背景变量进行多群组分析, 或是探究这些背景变量是否会影响转变概率。本研究将引入入学方式协变量, 分别进行多群组分析和交互效应分析。入学方式协变量共有 3 个类型, 分别为高考统招, 自主招生, 以及保送和特长生。为了让模型更好地被识别, 减轻运算负担, 将协变量拆分为 2 个虚拟变量作为新的协变量 dummy1 和 dummy2。dummy1 中 1 为高考统招, 0 为其他方式; dummy2 中 1 为自主招生, 0 为其他方式; 如果两个新的协变量上都为 0, 那么就属于保送和特长生。

首先引入协变量进行多群组分析, 模型可以分为测量不变和测量不等两种情况。在测量不变

情况下, 仅仅在随机截距潜在转变分析模型的基础上引入两个虚拟协变量, 让它们影响 c_1 和 c_2 ; 而在测量不等情况下, 不仅设定两个虚拟协变量影响潜在类别变量, 还需要额外设定两个虚拟协变量直接影响各观测指标。运用两种模型设定进行分析, 结果如表 6 所示。由于测量不变模型嵌套于测量不等模型, 所以可以使用卡方变化检验分析。两模型的参数数目相差 60, 所以自由度变化值为 60; 依据对数似然值和修正缩放指数, 依照 Satorra 等人的方法(Satorra & Bentler, 2010)计算出卡方变化值 941, 结合自由度变化值得出显著性 $p < 0.001$, 拒绝原假设, 卡方变化检验指向测量不等模型为更优模型。但测量不变模型的贝叶斯指数 BIC 更小, 且参数数目较少, 模型更为简洁, 所以后续检验交互效应时将使用该测量不变模型。检查输出结果后发现, 绝大多数协变量与各潜在类别间的回归系数不显著, 只有 $c_{1\#1}$ 在 dummy2 上的回归系数显著, 为 -2.364。这说明通过自主招生项目进入该院校的学生属于消极组的比数对数比通过保送或特长生进入该院校的学生低 2.364, 自主招生项目学生相对保送、特长生属于消极组的人数显著更少。

其次引入协变量进行交互效应分析。此处的交互效应是指协变量与潜在类别 c_1 的交互效应, 影响潜在类别 c_2 。如果结果支持交互效应, 那就说明入学方式协变量还会影响转变概率。模型可以分为三种情况: 引入协变量直接影响随机截距 f ; 引入协变量直接影响随机截距 f 和 c_1 、 c_2 ; 引入协变量不但直接影响随机截距 f 和 c_1 、 c_2 , 还额外

表 6 引入入学方式协变量后的多群组分析结果(N = 634)

所分析模型	参数数目	对数似然值	BIC	卡方变化	自由度变化	p
随机截距潜在转变分析, 测量不变	56	-5716.87	11795.06			
随机截距潜在转变分析, 测量不等	116	-5673.43	12095.30	941	60	<0.001

表7 引入入学方式协变量后的交互效应分析结果($N = 634$)

所分析模型	参数数目	对数似然值	BIC	卡方变化	自由度变化	p
协变量影响 f	50	-5725.02	11772.65			
协变量影响 f 和 c_1 、 c_2	58	-5716.83	11807.87	29	8	<0.001
协变量影响 f 和 c_1 、 c_2 , 交互效应	70	-5713.66	11878.96	1237	12	<0.001

考虑协变量与 c_1 的交互效应影响 c_2 。运用三种模型设定进行分析,结果如表7所示。由于三种模型互相嵌套,所以可以使用卡方变化检验分析模型。依照Satorra等人的方法进行计算(Satorra & Bentler, 2010),两组模型比较的显著性 $p < 0.001$,拒绝原假设,卡方变化检验指向交互效应模型为更优模型。但协变量影响 f 模型的贝叶斯指数BIC明显更小,且参数数目较少,模型更为简洁,所以协变量影响 f 模型为最优模型。检查输出结果后发现,随机截距 f 在dummy1和dummy2上的回归系数均不显著,说明不同入学方式对 f 的影响无显著差异。dummy1和dummy2通过 c_1 影响 c_2 的各项回归系数也都不显著,说明确实不需要引入交互效应。

5 方法总结与展望

本文介绍了随机截距潜在转变分析模型,并运用某研究型大学2016级本科生学习动机的追踪调查数据,演示了使用随机截距潜在转变分析的整个过程。我们还在OSF官网建立了研究项目,附上了本研究中各种待分析模型的Mplus语法,供读者借鉴与参考。

自上世纪90年代开始,潜在转变分析方法逐渐被应用于许多社会科学与行为科学研究。而随机截距潜在转变分析被认为是传统潜在转变分析的推进和发展,其最大贡献是通过引入随机截距 f ,吸收了不随时间点变化而变化的个案间差异,避免了高估转变概率矩阵对角线上潜在类别保留在初始类别的概率。相比普通潜在转变分析,随机截距潜在转变分析的模型拟合指数结果往往更好,可以有效处理样本存在显著初始差异的问题。为了验证随机截距潜在转变分析估计模型参数的有效性,需要保存参数估计结果,用于蒙特卡洛模拟研究。为了进行多群组比较或是研究特定背景变量的交互作用,可以引入协变量。

作为国际学术界于2020年提出的一种新方法,随机截距潜在转变分析衍生模型较多,应用

于实证研究的效果尚待检验,也有许多领域需要进一步研究。本研究数据分析过程中发现,当卡方变化检验、对数似然值与贝叶斯指数BIC结果相悖时,模型如何选取有待进一步考证;模型中使用二分虚拟变量指标可以帮助模型的识别和快速运算,但可能造成天花板或地板效应,造成模型参数估计的异常,如何选取因变量类型是一个值得研究的问题;随机截距潜在转变分析模型假设同一观测指标在不同时间点随机截距 f 上的因子载荷完全相等,这会造成因子得分的增加对各个时间点的影响相同,但显然这一简洁的模型设定很可能不符合实际数据样本;根据Muthén和Asparouhov文章中的阅读熟练度实例,跨时序因子分析(longitudinal factor analysis)模型的各项模型拟合指数均要优于随机截距潜在转变分析模型,那么仍然选择随机截距潜在转变分析模型解释数据样本的依据需要思索(Muthén & Asparouhov, 2019);Muthén和Asparouhov文章中的蒙特卡洛模拟研究只探究了有限的情况,未来研究仍可以针对随机截距潜在转变分析模型所需的样本量、适宜的时间点数目、适宜的观测指标数目、适宜的潜在类别数目进行探究。此外,随机截距潜在转变分析模型是以多水平分析的思路为灵感,实际进行的仍然是单水平分析,未来该模型必将被引入多水平分析。目前在Mplus 8.5最新版本中仍然无法运行多水平随机截距潜在转变分析,这也是该软件今后更新发展的方向。

参考文献

- 胡俊,张敏强.(2013年11月).青少年自我伤害行为的潜在类别及其转变分析.《心理学与创新能力提升——第十六届全国心理学学术会议论文集(pp.374-375)》,江苏,南京.
- 廖友国,连榕.(2020).成人抑郁症状的潜在转变分析:四年追踪研究.《中国临床心理学杂志》,28(3),518-522. doi:10.16128/j.cnki.1005-3611.2020.03.018
- 刘爱楼,欧贤才.(2018).大学生自杀风险的类别转变:潜在转变分析.《西南大学学报(社会科学版)》,44(2),104-

- 111+193. doi:10.13718/j.cnki.xdsk.2018.02.012
- 王碧瑶, 张敏强, 张洁婷, 胡俊. (2014年10月). 青少年问题行为的类型: 基于潜在转变分析的结果. *第十七届全国心理学学术会议论文摘要集*(pp.742-745), 北京.
- 王碧瑶, 张敏强, 张洁婷, 胡俊, 攸佳宁, 梁耀坚. (2015). 青少年自我伤害行为的潜在转变分析: 一项纵向研究. *心理科学*, 38(6), 1368-1376. doi:10.16719/j.cnki.1671-6981.20150613
- 吴国婷, 张敏强, 倪雨菡, 杨亚威, 漆成明, 吴健星. (2017年11月). 老年人孤独感的转变及其影响因素: 基于潜在转变分析. *中国心理学会第二十届全国心理学学术会议--心理学与国民心理健康摘要集*(pp.722-723), 重庆.
- 吴国婷, 张敏强, 倪雨菡, 杨亚威, 漆成明, 吴健星. (2018). 老年人孤独感及其影响因素的潜在转变分析. *心理学报*, 50(9), 1061-1070.
- 吴鹏, 刘华山. (2011年10月). 攻击性初中生的类别及其转变: 一个潜在类别模型的应用. *增强心理学服务社会的意识和功能——中国心理学会成立90周年纪念大会暨第十四届全国心理学学术会议论文摘要集*(pp.139), 陕西, 西安.
- 谢晋艳, 黎光明, 侯桂云, 甄锋泉. (2018年11月). 基于LPA的青少年网络成瘾: 潜在转变分析. *第二十一届全国心理学学术会议摘要集*(pp.644-646), 北京.
- 杨晓霞, 陈亮, 曹衍森, 毕馨文, 陈光辉, 张文新. (2020). 青少年早期同伴侵害的亚类别及其稳定性: 个体定向的分析. *心理发展与教育*, 36(2), 146-156. doi:10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2020.02.03
- Asparouhov, T., & Muthén, B. (2014). Multiple-group factor analysis alignment. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 21(4), 495-508.
- Cochran, G., Field, C., & Caetano, R. (2015). Changes in classes of injury-related risks and consequences of risk-level drinking: A latent transition analysis. *The Journal of Behavioral Health Services & Research*, 42(3), 355-366.
- Cole, D. A., Martin, N. C., & Steiger, J. H. (2005). Empirical and conceptual problems with longitudinal trait-state models: Introducing a trait-state-occasion model. *Psychological Methods*, 10(1), 3-20.
- Collins, L. M., & Lanza, S. T. (2009). *Latent class and latent transition analysis: With applications in the social, behavioral, and health sciences* (Vol. 718). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Collins, L. M., & Wugalter, S. E. (1992). Latent class models for stage-sequential dynamic latent variables. *Multivariate Behavioral Research*, 27(1), 131-157.
- Cosden, M., Larsen, J. L., Donahue, M. T., & Nylund-Gibson, K. (2015). Trauma symptoms for men and women in substance abuse treatment: A latent transition analysis. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 50, 18-25.
- Eid, M., Holtmann, J., Santangelo, P., & Ebner-Priemer, U. (2017). On the definition of latent-state-trait models with autoregressive effects. *European Journal of Psychological Assessment*, 33(4), 285-295.
- Eid, M., & Langeheine, R. (1999). The measurement of consistency and occasion specificity with latent class models: A new model and its application to the measurement of affect. *Psychological Methods*, 4(1), 100-116.
- Eid, M., & Langeheine, R. (2003). Separating stable from variable individuals in longitudinal studies by mixture distribution models. *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives*, 1(3), 179-206.
- Hamaker, E. L., Kuiper, R. M., & Grasman, R. P. (2015). A critique of the cross-lagged panel model. *Psychological Methods*, 20(1), 102-116.
- Jagenow, D., Raufelder, D., & Eid, M. (2015). The development of socio-motivational dependency from early to middle adolescence. *Frontiers in Psychology*, 6, 194.
- Kenny, D. A., & Zautra, A. (1995). The trait-state-error model for multiwave data. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 63(1), 52-59.
- Kenzik, K. M., Martin, M. Y., Fouad, M. N., & Pisu, M. (2015). Health-related quality of life in lung cancer survivors: Latent class and latent transition analysis. *Cancer*, 121(9), 1520-1528.
- Liu, Y., Liu, H., & Hau, K. T. (2016). Reading ability development from Kindergarten to junior secondary: Latent transition analyses with growth mixture modeling. *Frontiers in Psychology*, 7, 1659.
- Muthén, B., & Asparouhov, T. (2019). *What multilevel modeling can teach us about single-level modeling: Latent transition analysis with random intercepts (RI-LTA)*. Version 1. Retrieved October 9, 2020, from <http://www.statmodel.com/RI-LTA.shtml>
- Muthén, B., & Asparouhov, T. (2020). Latent transition analysis with random intercepts (RI-LTA). Version 4. Accepted for publication in *Psychological Methods*. Retrieved October 9, 2020, from <http://www.statmodel.com/RI-LTA.shtml>
- Nylund, K. (2007). *Latent transition analysis: Modeling extensions and an application to peer victimization* (Unpublished doctoral dissertation). University of California, Los Angeles.
- Pan, Y., Liu, H., Lau, P., & Luo, F. (2017). A latent transition analysis of bullying and victimization in Chinese primary school students. *PLoS One*, 12(8), e0182802.
- Ryoo, J. H., Wang, C., & Swearer, S. M. (2015). Examination of the change in latent statuses in bullying behaviors across time. *School Psychology Quarterly*, 30(1), 105-122.
- Ryoo, J. H., Wang, C., Swearer, S. M., Hull, M., & Shi, D.

- (2018). Longitudinal model building using latent transition analysis: An example using school bullying data. *Frontiers in Psychology*, 9, 675.
- Satorra, A. & Bentler, P. M. (2010). Ensuring positiveness of the scaled difference chi-square test statistic. *Psychometrika*, 75, 243–248. doi:10.1007/s11336-009-9135-y
- Wang, J., & Wang, X. (2019). *Structural equation modeling: Applications using Mplus*. John Wiley & Sons.

Random intercept latent transition analysis (RI-LTA): Separating the between-subject variation from the within-subject variation

WEN Congcong¹, ZHU Hong²

(¹ International College, Xiamen University, Xiamen 361102, China)

(² Institute of Economics of Education, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: In 2020, Muthén and Asparouhov proposed a so-called random intercept latent transition analysis (RI-LTA) model which separates between-subject variation from within-subject variation. In the current study, a two-wave longitudinal data collection from undergraduates attending in the year 2016 at a research-oriented university was used to demonstrate how to implement RI-LTA in Mplus. We performed the RI-LTA analysis, a multiple-group analysis and investigated the interaction effects by including a “type of university enrolment” covariate. Results showed that RI-LTA avoided overestimation on the transition probabilities of students staying in the original class and allowed for clearer interpretation of the data.

Key words: latent transition analysis, random intercept latent transition analysis, single-level analysis, multi-level analysis, Monte Carlo simulation study